[redacted]
DLP 0 1 -10- 93002248

ISSN 0980-8507

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

LORRAINE

GRANDES CULTURES

Bulletin n° 18 du 29 septembre 1993

Colza - **Altises : Taux d'attaque.**
- **Charançon du bourgeon terminal : Premières captures.**
- **Pucerons : Début du vol.**
- **Limaces : Vigilance.**

Céréales - **Pucerons, cicadelles : Surveiller.**
- **Attention aux limaces.**

Colza

Les colzas sont entre les stades 2 et 6 feuilles, mais de façon très hétéorogène dans les parcelles.

Altises

Le seuil de traitement de plus de 30 % de pieds porteurs de morsures est parfois atteint localement. Dans ce cas traiter. Dans les autres secteurs, continuer à surveiller les parcelles et les cuvettes jaunes.

Observations faites dans quelques parcelles
% de plantes avec morsures

Meurthe-et-Moselle				Meuse				Moselle	
Agincourt :	0	Braumont :	18	Rouvroy :	54	Moutiers-les-V.:	0	Verny :	12
Leyr :	30	Nonsart :	8	Spincourt :	10	Abainville :	2	Bertrange :	10
Cons 1 :	40	Flirey :	22	Etain :	12	Horville :	14	Rouilly :	16
Cons 2 :	26	Lagney :	6	Braquis :	8	Bure :	18		
Nomeny :	22	Grosrouvres :	0	Fresnes-en-W. :	10	Biencourt-sur-O. :	2		
				Ourches :	8	Le Bouchon-sur-S. :	10		

Charançon du bourgeon terminal

Les premières captures ont été observées dans la région de Nancy les 20 et 21 septembre. Surveiller bien vos cuvettes. Intervenir 10 jours après les premières captures, soit à la fin du mois dans les régions les plus précoces.

Pucerons

Ils apparaissent avec, localement, le développement des premières colonies. Ces pucerons peuvent transmettre des virus et entraîner des pertes de rendement non négligeables. Il est difficile à l'heure actuelle de faire la différence entre le dégât direct et la nuisibilité des viroses. Surveiller attentivement vos parcelles, surtout si le temps redevient chaud. Aucun traitement ne se justifie jusqu'à présent. Seuls 2 % des pieds sont porteurs de pucerons actuellement.

P 372

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51

SPV

ABONNEMENT ANNUEL 300 F

Imprimerie de la DRAF - Directeur-gérant : D. VERBEKE - Publication périodique CPPAP N° 2011 AD - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation - ISSN 0980 - 8507

Céréales

Les orges et blés semés avant le 20 septembre lèvent, les plus en avance sont au stade 1 feuille.

Les mauvaises conditions climatiques n'ont pas encore permis l'installation des insectes d'automne : cicadelles et pucerons.

Dès la levée, surveiller les pucerons sur les feuilles et vérifier la présence de cicadelles dans les cuvettes jaunes. Au vu des conditions météorologiques actuelles, il est peu probable que les cicadelles se développent.

Céréales - Colza

Limaces

Attention, elles sont nombreuses dans toutes les parcelles présentant des interstices favorables à leur circulation (pierres, mottes, déchets,...).

Surveiller leur présence dès le semis et intervenir si nécessaire.